


ПЕРЕНОС ПОСТРАДАВШИХ

ПЕРЕНОС ОДНИМ СПАСАТЕЛЕМ



ПЕРЕНОС ДВУМЯ СПАСАТЕЛЯМИ



САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ пострадавшего при шоке (травматическом шоке), травмах головы, позвоночника, нижних конечностей, таза **ЗАПРЕЩЕНО**. Переносить его можно только после выведения из терминального состояния, восстановления устойчивого дыхания и пульса.

НОСИЛКИ ИЗ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОСИЛОК

Укладывают пострадавшего на носилки два спасателя. Носилки ставят справа от пострадавшего. Оба спасателя отползают на колени - первый на уровне плеч, второй у коленей пострадавшего



Первый спасатель левой рукой захватывает грудь пострадавшего, а правой фиксирует голову. Второй спасатель левой рукой захватывает голени пострадавшего сверху, а правой его бедро снизу. По команде первого спасателя осторожно поднимают пострадавшего на уровень носилок, а затем по второй команде спускают на них.

Если пострадавший в тяжелом состоянии, его переносят головой вперед. Тогда третий спасатель (медицинский работник) следит за состоянием пострадавшего и одновременно делает ему внутрисосудистое введение соответствующих лечебных растворов.



ПОВРЕЖДЕНИЕ	ПОЛОЖЕНИЕ НА НОСИЛКАХ
Ранения, ожоги нижних конечностей, травмы переднего и боковых отделов туловища. При переломах позвоночника - на шее	На спине горизонтально
Травмы головы, мозга, открытые переломы черепа, если сознание сохранено и симптомов шока нет	Голова приподнята
Открытый перелом черепа	Голова и туловище приподняты 10 - 15°
Тяжелый шок или угроза его развития	Ноги выше головы 10 - 15°
Массивная кровопотеря, шок, угроза развития шока или клиническая смерть	Ноги приподняты
Повреждение органов грудной полости, особенно при острой дыхательной недостаточности; травмы лица, глаз, челюстей, шеи, груди; переломы костей рук, если нет угрозы шока	Сидя или полусидя
Переломы костей таза, травмы живота	Голова на лямке, фиксируется лямкой. Шины над коленями и между ягодиц
Переломы позвоночника с ожогами или ранениями спины (на шее). Ранения челюстей, носа, лица с кровотечениями	Голова повернута на бок
После выведения из тяжелого шока, терминального состояния, при потере сознания	Нога на бок